辨證錄

辨證錄卷之八

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

瘧疾門

人有發瘧先腰痛頭疼且重寒從背起先寒後熱熱如火熾熱止汗出不能即乾遍身骨節無不痠痛小便短赤世俗皆稱脾寒此乃太陽膀胱經之瘧也夫風邪從太陽經而入即瘧邪也惟是冬月風邪入太陽而成傷寒若夏秋風邪入太陽而成瘧耳蓋冬月之風乃至寒之風夏秋之風乃至熱之風也風不同而病亦異總之無

食無痰不能成瘧夏秋之間明是熱風作祟畏任痰食不化行於陰而作寒行於陽而作熱也夫痰食之類遇寒則停住遇熱宜流通何反裹痰食而不化此乃寒熱酷烈因脾胃之衰盛以分勝負邪旺之極正不能敵邪遂至狼狽無津液以養身體骨節所以痠痛也正既不能敵邪邪勢更張反堵截其關津路戶小便不能遠出而邪火入之此所以短赤也治法健脾胃之土散太陽之邪消痰化食邪無所恃而自散矣方用開邪散白术五錢茯苓五錢前胡一錢柴胡一錢甘草五分猪苓二

錢人參一錢青皮一錢枳殼一錢白豆蔻三分山查一錢半夏一錢水煎服一劑輕再劑又輕三劑全愈此方健脾胃之氣則土旺敢與邪戰健脾胃之中用利水化濕之藥引邪直走於膀胱太陽之經邪從太陽而入仍從太陽而出在本經尤易分消耳方中不專散太陽之邪而兼表少陽之鬱葢少陽乃太陽之去路早斷其竄走之途則邪不得不仍趨太陽原路而去況消痰化食之品無不用之得宜則堂堂之陣自然望旗幟而驚遁矣

此症用加味四君湯亦甚效

人參　甘草　桂枝各一錢　白朮　茯苓各五錢　半夏二錢　水煎服

人有發瘧之時身先發熱頭疼鼻乾渴欲飲水目眴眴不得眠甚則煩燥畏火光厭聽人聲喧嘩人謂熱病誰知是陽明胃經之瘧乎夫陽明胃土也邪入陽明其勢自大蓋陽明多氣多血之經其容水穀亦至盛宜足以容邪何邪入反能作祟蓋水穀之氣盛正足資盜賊之糧也譬如賊居深山勢不甚張及至入於城市則妄行流毒恣其擄掠無有止足也陽明胃經之邪亦復如是若

胃中水穀未足充其飢渴必索水以救其内炎渴甚多飲則水停於心胃之中心氣爲水所遏不得下交於腎則心腎兩開何能寐乎心不能下交於腎則腎畏火炎何敢上交於心以滋心中之液自然心無所養而煩燥生火邪更熾傷火畏火喜靜而不喜動人聲喧嘩安得不惡總皆陽明熱邪作祟也治法可不急瀉其陽明之熱邪乎然而火邪居於胃中爍乾津液胃氣必虛但瀉其邪不補其正則正氣消亡邪益跳梁是終無痊可之日也故必須補中以瀉其火熱之邪則正不傷而邪亦

易解也方用平陽湯乾葛二錢人參三錢白朮五錢貝母三錢橘紅一錢石膏三錢麥冬五錢柴胡一錢茯苓五錢水煎服一劑輕再劑又輕四劑全愈此方以人參白朮助脾胃之氣乾葛石膏瀉陽明之火邪貝母橘紅消陽明之痰食麥冬滋肺經之炎柴胡舒胆經之鬱茯苓泄太陽之滯既攻補兼施復彼此相制邪安得不退避哉

此症用伐邪湯亦效

石膏人參各三錢半夏柴胡各二錢麥冬五錢茯苓一兩甘草厚朴枳殼各一錢水煎服

人有瘧病初發之時往來寒熱口苦耳聾胸脇脹悶作痛或嘔或不嘔人以為火熱之瘧也誰知是少陽膽經之瘧乎夫風邪入於人身不敢遽入於臟每伏於半表半裏之間乘人虛弱而後深入進退於表裏而寒熱生焉故進與陰相爭則寒出與陽相爭則熱半表半裏者少陽之地也瘧發之時必有寒熱之兆寒熱之往來適在少陽所主之位口苦者膽汁外泄也耳聾者膽氣不舒也胸脇脹悶作痛者膽血有滯也或嘔或不嘔者膽邪挾痰食而上冲也治瘧之法甚多烏可舍少陽而別治

然治少陽之瘧有偏陰偏陽之分偏陰則多寒偏陽則多熱有純熱無寒有純寒無熱之時補偏救敝總不可離少陽而求恊其和平也方用和瘧湯柴胡三錢當歸一兩白朮五錢茯苓五錢半夏一錢甘草五分生薑五錢白芍五錢山查一錢青皮一錢水煎服一劑輕二劑又輕三劑全愈此方無一味不入少陽之經絡又無一味不入脾胃之臟腑祛邪復能輔正解表隨可固裏真和解之仙丹非特祛瘧之神劑也

此症用首攻湯亦效

白芍五錢當歸二錢茯苓五錢半夏二錢香附三錢羗活五分甘草神麯各一錢水煎服

人有發瘧之時先寒作顫寒後變熱面色蒼白善起太息之聲甚者狀如欲死或頭疼而渴人以為寒熱相間之瘧誰知是厥陰肝經之瘧乎夫肝經之瘧由少陽胆經而入若肝木自旺則少陽之邪何敢深入今因肝木之虛邪遂乘機突入矣肝氣本急邪入肝中宜有兩脇脹滿之兆茲安然不見有此等之病是肝之大虛也葢肝旺必怒不怒而起太息之聲者是肝弱之極不敢怒而又不能制其邪故反生太息也甚如欲死者因氣逆不

能發聲也氣逆則火升於上而不易下降咽喉自存火氣而作渴矣治法自宜急補肝以祛邪不可縱邪以伐肝也方用補肝祛痰湯白芍一兩當歸一兩何首烏生用一兩鱉甲三錢茯苓五錢青皮一錢柴胡一錢半夏二錢甘草一錢水煎服一劑輕二劑全愈此方全不祛邪純補肝氣肝氣旺而邪氣雖留得柴胡引出於少陽之分則邪有出路自然易解矣

此症用護肝湯亦效

熟地鱉甲各五錢山茱萸二錢何首烏三錢白芥子三錢當歸一兩柴胡一錢五分水煎服

人有發瘧之時先寒後熱寒從腹起善嘔嘔已乃衰熱過汗出乃已人以爲感邪作瘧誰知邪盛於太陰之脾經乎夫脾乃濕土原易生痰食即難化又得風邪合之自易成瘧夫各經之瘧俱宜兼顧脾土豈脾土自病反置脾於不補乎惟是脾乃濕土其性原濕單補脾土則土不能遽健痰濕之氣不能驟消嘔吐之逆未易安也必須兼補命門之火則土得溫和之氣而痰濕自化風邪無黨難於作威欲久踞脾而不可得矣故治法不治脾不可單治脾亦不可也方用溫脾祛瘧湯白朮一兩茯

苓五錢山藥五錢芡實五錢人參三錢肉桂一錢炮姜一錢橘皮一錢半夏一錢甘草一錢白豆蔻三粒水煎服一劑嘔吐定二劑寒熱除三劑全愈夫瘧病多本於脾寒此方尤治脾寒聖藥凡是脾胃虛寒而得瘧症者將方煎服無不神效正不必問其一日二日之瘧也

此症用加味朮苓湯亦效

白朮二兩茯苓五錢半夏三錢肉桂二錢生薑一兩白豆蔻三粒水煎服

人有發瘧之時寒熱俱盛腰痛脊強口渴寒從下起先脚冷後由腿冷至臍由臍冷至手而止其頸以上則不冷

人以爲寒瘧也誰知是足少陰腎經之瘧乎此瘧最宜早治亦須補陰爲主倘不補其陰開手用袪邪之藥必變爲四日兩發之瘧也益此瘧原是內傷於陰邪乘陰虛而入之初起時陰不甚虛即用補陰之劑加入散邪之味則隨手奏功無如人但去袪邪不知補正遂至陰愈虛而邪益深也雖然邪乘陰虛深入吾仍補其陰陰日盛而邪日退何不可治之有夫邪既深入尚且補其陰而邪退況邪初入之時補陰而邪有不速退者乎方用退邪湯熟地一兩何首烏生用一兩當歸五錢鱉甲

五錢茯神五錢山藥五錢白芥子三錢柴胡五分人參三錢水煎服一劑輕二劑又輕四劑全愈此方補腎中之陰何加入柴胡人參舒少陽之氣健脾胃之土耶不知邪入於腎必須提出於少陽半表半裏之間風邪易於消散又恐柴胡入於至陰而提出於至陽非用人參則升提無力故用之以健其脾胃則脾胃有生氣陽足以升陰也況鱉甲首烏俱是入陰攻邪之藥邪見陰分之中無非能征善戰之將何敢久戀於陰而不去乎越出於陽分陽氣不虛豈容邪之存住陰陽並攻邪見之

却走矣

此症用四瘧散亦效

熟地二兩　白朮一兩　甘草一錢　山茱萸一兩　人參五錢　白芥子三錢　柴胡三分　荊芥一錢炒黑　水煎服

人有四日兩頭發瘧者終年累月不愈但有熱而不寒雖有汗而不渴每發於夜人以爲陰虛之極誰知是陽衰之極乎夫邪入人身每乘陰陽之虛然瘧之初入必先入陽而後入陰入於陽則發近入於陰則發遠入於至陰之中則其發更遠四日兩發者乃內經所云間二日之瘧即邪入於至陰也最難祛逐以陽氣衰微不敢與

邪相戰邪得安居於至陰之中耳夫邪正原不兩立正不容邪而邪每欺正令邪居於至陰譬如强梁之輩僑寓人家欺主人之軟弱鵲巢鳩居心忘主人於戶外矣四日兩發之瘧情形實有相似故治法必須大補陽氣後益之以攻陰邪之藥則邪出而與陽相角始可成功倘以爲陰虛惟用滋陰之藥則邪且樂得相資雖佐之祛邪之味彼且謹閉至陰之藏而不出矣方用提陰升陽祛邪湯人參一兩白朮一兩何首烏生用二兩鱉甲一兩茯苓五錢熟地一兩山茱萸五錢肉桂一錢柴胡

一錢白芥子三錢水煎服二劑反覺寒熱交戰而病重再服二劑寒熱不生全愈矣此方雖陰陽雙補而意重補陽陽旺則敢與邪鬭故初服之而病重者正陽氣與邪氣交戰也兼補陰者助其陰氣之旺則陰旺而邪不敢重囘於至陰之内用柴胡於補陰補陽之中者提出陰氣以交於陽則邪亦從陰俱出一遇陽氣則彼此大鬭又有鱉甲何首之輩超勇絕倫邪有不披靡而遁哉故一戰不勝連戰未有不勝者也

此症用遠瘧湯亦佳甚

人參山茱萸鱉甲當歸各一兩白朮熟地各二兩山藥五錢附子一錢柴胡五分白芥子三錢水煎服

人有哀哭過傷病後成瘧困倦甚疲人以為瘧母之未消誰知是陰陽兩虧乎夫瘧之盛衰全視乎陰陽之衰旺也下多亡血亡其陰也悲哀傷氣傷其陽也陰陽兩虧正氣虛極何能與邪氣相爭惟聽瘧邪之往來邪盛則盛邪衰則衰治法宜助正以祛邪倘惟事攻邪而不知補正則正氣愈虛汗必大出陰虛陽散欲不亡得乎方用救正湯人參一兩黃芪一兩白朮二兩炙甘草一錢當歸五錢半夏三錢水煎服連服數劑瘧止十劑全愈

夫瘧邪之久居不散者正藉痰氣之彌滿耳補正氣以消痰氣則正氣自旺痰氣自消此瘧之更易痊也此方全在用半夏之神補非呆補消非峻消矣

此症用救哀湯亦效

黃芪一兩　白朮二兩　人參五錢　茯苓一兩　鱉甲　山茱萸　白芍各五錢　半夏三錢　水煎服

人有一時病瘧自卯足寒至酉分方熱至寅初乃休一日一夜止甦一時人以爲風邪之入於營衛也誰知是寒氣之入於陽明乎夫足陽明與衝脉合宗筋而會於氣街行房之後陽明與衝脉之氣皆奪其所用其中空虛

寒邪相犯即乘虛而入舍於二經之間二經過歷會足
䟕上因邪之相合而二經之陽日虧不能滲榮其經絡
故痁行而不能止也治法補二經之虛兼散其寒邪則
陽氣自旺寒邪難居得汗可解然而足䟕道遠藥力未
易驟到非多加藥餌何能取勝哉方用解寒湯人參五
錢白朮一兩附子三分蒼朮三錢川芎二錢柴胡五分
水煎服二劑汗出而愈此方用參朮以大補其氣佐之
蒼朮川芎柴胡以發其汗用附子以引至陽明衝脉宗
筋氣街之所自然氣因補而無秘塞之憂邪得散而無

閉結之患矣

此症用參朮附半湯亦效

人參一兩　附子二錢　半夏三錢　白朮二兩　水煎服二劑全愈不必再服

人有瘧病發寅申巳亥之時者人以爲痰瘧也然亦知爲陰中之陽與陽中之陰乎夫同一瘧病何以分其陰陽哉大約晝發者爲陰中之陽夜發者爲陽中之陰也故晝發者發於巳而退於申巳陽而申陰也夜發者發於亥而退於寅亥陰而寅陽也以此而辨別陰陽斷不少悞然則症既分陰陽治法烏可合治之乎吾以爲未嘗

不可合治也雖陽病在於氣虛陰病在於血少然而無痰無食終不成瘧消化痰食寧有異哉且痰食之不消而結成瘧母要不離乎肝氣之鬱結以下尅夫脾土也疎肝以健土則脾之氣旺而痰與食自化是治肝以治瘧陰陽正不可異也方用疎肝兩消湯白芍三錢白朮五錢陳皮一錢半夏一錢當歸三錢厚樸一錢柴胡二錢茯神三錢白芥子一錢氣虛者加人參三錢血虛者加熟地八錢水煎服八劑必發大汗而愈此方陰陽兩治之法也陰中引陽以出於陽分而陰又不傷陽中引

陰以離於陰分而陽又無損兩相引而陰陽之正氣日盛自然兩相制而陰陽之邪氣日消況氣虛加人參以助陽血虛加熟地以滋陰又陰陽之分治何瘧之不除哉人見其治瘧之神也遂以此方能統陰陽而治瘧也誰知單消痰食止疎其肝氣之鬱結乎

此症用散母湯亦效

人參何首烏半夏鱉甲各三錢白芍白朮各五錢柴胡一錢青皮神麴各二錢水煎服

虛損門

人有多言傷氣咳嗽吐痰久則氣怯肺中生熱短氣嗜臥不進飲食骨脊拘急疼痛發痠夢遺精滑潮熱出汗脚膝無力人以爲癆怯之症也誰知其先傷於氣乎夫傷氣者傷肺也肺傷則金弱不能生水腎經無滋化之源何能分餘潤以養臟腑乎肺金生熱則清肅之令不行膀胱之氣不化脾胃俱失其運化之權土虧而金益弱金弱而木益虛水難養肝而木燥水難灌心而火炎木强則侮金火勝則尅肺欲氣之旺也得乎氣衰則不能

攝精精涸則不能收汗汗出則不能生力此骨痿之所以痠疼飲食懈怠而嗜臥也治法必須先補其肺更宜兼補脾胃蓋肺氣不能自生補其脾胃則土能生金脾胃爲肺金之母也方用益肺丹人參三錢白朮三錢當歸三錢麥冬五錢北五味三分柴胡五分荊芥五分山藥三錢芡實三錢水煎服四劑而脾胃之氣開又四劑而咳嗽之病止又服四劑痠疼之疾解又四劑潮熱汗出之症痊再服十劑氣旺而各恙俱愈或疑損其肺者益其氣未聞損其氣者益其肺也不知益肺實益氣也

肺衰則氣衰肺旺則氣旺氣衰烏可不補肺哉若補肺何能舍脾胃而他補乎

此症亦可用壯氣湯治之

人參三錢　麥冬一兩　甘草三分　百合一兩　貝母三分　水煎服

人有失血之後不知節勞愼色以致內熱煩渴目中生花見火耳內蛙聒蟬鳴口舌糜爛食不知味鼻中乾燥呼吸不利怠惰嗜臥又不安貼人以爲癆瘵之漸也誰知是傷血而成之乎夫肝藏血失血者乃肝不藏血也然其由非大怒以動其血卽大勞以損其血也雖動與損

不同而補血養血必宜合一無如酒色財氣無非動血之媒耳目口鼻無非損血之竅養血者旣無其方補血者又缺其藥此失血者往往難痊因循誤治不至於死亡不已也倘一見失血即用平肝止血之藥治之何至於瀕傷不救但失血成損苟徒補其血則血不可以驟生而耗血之臟腑損於內爍血之情慾損於外亦必死之道也蓋補血必須補氣而養血必宜益精使陰陽兩資於上下而中焦肝臟之血已損者能增未損者能固也方用緩中湯白芍一兩當歸一兩人參一兩甘草一

錢熟地一兩山茱萸五錢麥冬五錢三七根末三錢荊
芥炒黑一錢炒黑姜炭五分水煎服一劑睡臥安二劑
煩渴止十劑病減半二十劑又減半三十劑全愈此方
氣血精同補之藥也然補氣藥少於補精血之藥者以
失血之病畢竟陰虧吾重補其陰而少補其陽則陽能
生陰陽不至於大亢陰能制陽陰不至於太微自然氣
行於血之中以生血即血固於氣之內以藏血也寧尚
有走失之患哉況方中原有荊芥之引經姜炭三七根
之止血又用之無不咸宜者乎

此症用八物湯亦佳

白芍山藥各五錢當歸熟地麥冬各一兩甘草五分丹皮沙參各三錢水煎服

人有入房縱慾不知葆澀以致形體瘦削面色痿黃兩足乏力膝細腿搖皮聚毛落不能任勞難起牀席盜汗淋漓此損精而成勞症也夫陰精足者其人壽未有精虛而能長年者也然而精足者舉世絕無其人所以腎有補而無瀉其或病或不病亦分之於能節與不能節耳世人貪片刻之歡至於死亡無論也泄精未至於死亡烏忍其病而不救要不能舍塡精而別求異術也然而

填精實難泄精既多者不特傷腎必且傷脾脾傷胃亦傷矣胃爲腎之關門胃傷則關門必閉雖有補精之藥安能直入於腎宮是補腎必須補胃胃與脾爲表裏補胃而補脾在其中故填精之藥斷宜合三經同治耳方用開胃填精湯人參三錢白朮五錢熟地一兩麥冬三錢山茱萸三錢北五味一錢巴戟天一兩茯苓三錢肉豆蔻一枚水煎服連服十劑精神生飲食知味胃氣大開再用十劑可以起衰再用十劑前症頓愈此方雖非起死之方實係填精妙藥填精而精足精足人可不死

然則此方正起死之方也人亦加意而用之乎

此症用扶弱湯亦妙

熟地一兩　石斛　麥冬各五錢　北五味子一錢　巴戟天　兔絲子各三錢　山茱萸五錢　水煎服

人有行役勞苦動作不休以至筋縮不伸臥牀呻吟不能舉步遍身疼痛手臂痠麻人以爲痿症之漸也誰知是損筋之故乎夫筋屬肝肝旺則筋旺肝衰則筋衰損筋是損肝也補肝其可緩乎然肝之所以衰旺者乃腎之故也腎水生肝木腎水足而肝氣旺腎水虛而肝氣衰故筋衰者必補其肝而肝衰者必補其腎雖然補其腎

肝受益矣但肝又去生心吾恐補腎以生肝尚不暇養筋也更須補其心氣之不足則肝不必去生心肝木得腎之滋枝葉條達筋有不潤者乎方用養筋湯白芍一兩熟地一兩麥冬一兩炒棗仁三錢巴戟天三錢水煎服二劑筋少舒四劑筋大舒十劑疼痛痠麻之症盡痊矣此方心肝腎三經同治之藥也凡三經之病均可用之非獨治傷筋不足之症在人通用之耳

此症用舒筋湯亦效

白芍熟地各一兩甘菊丹皮牛膝秦艽各二錢白朮五錢枸杞二錢葳蕤五錢水煎服

人有久立腿痠更立而行房則兩足必然無力久則面黃體瘦口臭肢熱盜汗骨蒸人以爲瘵病也誰知起於傷骨乎夫骨中籍髓以能堅骨無髓則骨空矣又何所恃而能立乎然而傷骨亦能耗髓況立而行房則骨與髓兩傷矣何能不病哉且傷骨中之髓者卽傷腎中之精也髓涸者腎水先涸也腎涸不能化髓骨中所以空虛也故欲補骨中之髓必先補腎中之精方用充髓丹熟地二兩山茱萸一兩金釵石斛五錢地骨皮三錢沙參五錢牛膝三錢五味子一錢茯苓三錢水煎服此方塡

補眞陰使腎水充足精滿髓充而骨健也倘用冷藥以損胃或用熱藥以助陽則熱乾津液燥以益燥必成爲癆瘵而不可救矣

此症用龜鹿飲亦效

熟地二兩山茱萸一兩金釵石斛牛膝虎骨龜膏杜仲各三錢山藥鹿角膠兎絲子白朮各五錢水煎服

人有過於歡娛大笑不止遂至唾乾津燥口舌生瘡渴欲思飲久則形容枯槁心頭出汗人以爲陰虛火動也誰知是陽旺火炎哉夫心屬陽火腎屬陰水陰水遇陽火而爍乾陽火必得陰水而灌漑是心火非腎水相交不

能止其炎上之性惟是心中無液則心必燥矣何心頭偏能出汗耶不知喜主心而喜極反至傷心蓋喜極則心氣大開液不上行於脣口盡越於心頭之皮肉矣故腎中之津到於心卽化爲汗何能上濟於廉泉之穴以相潤於口舌之間乎明是心氣之傷截流而斷塞也然則治法不必補腎水之源仍補其心氣之乏而廉泉之穴自通矣方用通泉飲炒棗仁一兩麥冬一兩天門冬三錢北五味一錢人參三錢丹參三錢遠志一錢當歸五錢甘草一錢柏子仁三錢水煎服一劑口潤再劑心

頭之汗止三劑諸症全愈此方補心氣之傷又是生津

生液之藥何必補腎以通源哉

此症用玄參蓮

棗飲亦佳

玄參三兩　丹皮炒　棗仁各一兩　丹參

五錢　柏子仁　蓮子心各三錢　水煎服

人有用心太過思慮終宵以至精神恍惚語言倦怠忽忽

若有所失腰脚沉重肢體困憊人以爲怯症之成也誰

知是勞心以至傷神乎夫心藏神神之久安於心者因

心血之旺也思慮無窮勞其心矣心勞則血必漸耗而

神無以養恍恍惚惚有無定之形且神宜靜不宜動神

動則心更動心動而血益虧血虧而神愈動雖有腎水之資而血不能滋雖有肝木之養而液不能入寡弱之君無以自立雖有良輔而四體不能強健此腰脚肢體所以沉重而困憊也治法必急救其心而救心必以安神爲主方用定神湯人參一兩茯神五錢白朮五錢丹參五錢遠志一錢生棗仁五錢丹砂末一錢柏子一錢巴戟天三錢黃芪一兩當歸五錢山藥三錢甘草一錢白芥子二錢水煎服一劑心安二劑神定十劑而身健矣此方心脾胃肺肝同治之藥也蓋心爲孤主非得心

包戴獲則神恐有下堂之走今得脾胃肺肝之同治則扶助有力心血易生心神自旺矣

此症用龍齒安神丹亦妙

人參麥冬各一兩黃連二錢柏子仁三錢龍齒火煆醋焠爲末一錢炒棗仁三錢甘草五分北五味子一錢水煎服

人有終日勞心經營思慮以致心火沸騰先則夜夢不安久則驚悸健忘形神憔悴血不華色人以爲心氣之弱也誰知是心血之虧乎夫心宜靜而不宜動靜則火不自炎腎水自然來濟若動則心腎兩不相交矣蓋腎水

非火不生然而腎得溫火而水易生腎得烈火而水易竭心過勞而火動正烈火而非溫火也腎畏避之不暇敢來上升以受火之威逼乎水不上升心愈乾燥必且自焚虛損之症成矣夫五臟之損損至心而亡今損不由五臟心先自損宜爲不治之症然而心宮寧靜原取給於各臟腑也各臟未損正有生機補各臟之氣自然虛者不虛損者不損也治法專補其脾腎肺肝之氣方用衛主生氣湯人參三錢白朮五錢麥冬五錢北五味五分白芍一兩白芥子二錢炒棗仁三錢玄參一兩水

煎服二劑心血生心氣亦旺矣此方五臟兼補之藥也然而兼補五臟又是獨補心宮所以為奇倘止補心而不補餘臟或單補一二臟而不五臟之兼補反有偏勝之憂非善補心傷虛損之法也

此症用益心丹亦可治

人參當歸各五錢麥冬炒棗仁各一兩天花粉北五味遠志神麴丹砂各一兩菖蒲五分兔絲子三錢水煎服

人有過於好色入房屢戰以博歡趣則鼓勇而鬬不易泄精漸則陽事不剛易於走泄於是骨軟筋麻飲食加少

畏寒之症生人以爲氣虛之故誰知是腎中之水火兩損乎夫腎中相火藏於命門之中乃水中之火也腎中水火不可兩離頻於泄精者似乎損水而不損火殊不知火在水中水去而火亦去也凡人火動之極而水泄之水泄之極而火無水養則火更易動而易泄水火兩傷欲腎之不損得乎治法必須大補腎中之水不可補夫腎中之火蓋水雖生於火而水涸之時驟補夫火則水不能制而火且炎上亦足以害之也惟大補夫水使水足以制火而火亦自生方用六味湯大劑煎飲服至兩

月然後加入附子肉桂以培補命門之真火則水火有既濟之妙庶幾兩受補陰補陽之益也世人認八味丸爲補陽之藥然仍於水中補火是補陽而兼補陰之藥也所以補火無亢炎之禍補水無寒冷之虞耳

此症用兔絲地萸湯亦神

熟地一兩　山茱萸五錢　兔絲子一兩　巴戟天五錢　水煎服

人有易於動怒雖細微飲食瑣碎居處家人父子之間無不以盛氣加之往往兩脇滿悶其氣不平遂致頭疼面熱胸膈脹痛人以爲肝氣之勝誰知是肝血之損乎夫

肝性最急得血以養惟肝中無血則肝氣抑鬱而不舒遂易動怒矣蓋肝氣最不能藏而喜泄肝氣藏則肝血必然外越肝血藏則肝氣必然外疏肝氣泄則肝血必然內生肝血泄則肝氣必然內鬱是二者原相反而相成者也今易於動怒者是肝血欲藏而不能藏肝氣欲泄而不能泄矣治法補肝血以使之藏平肝氣以使之泄而已方用逍遥散加味治之白芍一兩白朮五錢陳皮五分甘草五分茯苓當歸各五錢柴胡一錢炒梔子三錢半夏一錢荊芥炒黑三錢水煎服連服十劑血藏

於肝中氣攄於肝外兩得其宜也蓋此方原善疏肝經之鬱氣鬱解而氣自和况清其火血有寧靜之氣引其經血有返還之思重用白芍當歸以生其新血輕用柴胡半夏以解其逆氣所以兩收其功也

此症用加減生熟二地湯亦妙

生地熟地各一兩白芍麥冬各五錢山茰三錢北五味一錢炒梔子二錢甘草一錢水煎服

人有不食則腹中若饑食則若飽悶吞酸溏瀉日以爲常遂至面色痿黃吐痰不已人以爲胃氣之傷也誰知是脾氣之損乎夫脾爲胃土代行其傳化者也胃之氣全

籍脾氣之運動胃乃得化其精微不特脾受益而各臟腑之氣無不受其益也今脾氣受傷不能爲胃以代行其傳化不特胃之氣無以生而脾不得胃氣之化則脾亦受損而不受益勢必至脾胃兩損何能分其津液以灌注夫各臟腑之氣耶治法必大健其胃兼補夫脾蓋胃與脾爲表裏兩者宜合不宜離者也方用益脾湯人參一錢山藥五錢芡實三錢巴戟天三錢砂仁一粒半夏三分茯苓二錢扁豆一錢神麯一錢肉果一枚白术三錢水煎服服三月胃氣開再服三月脾氣壯但見有

益不知有損矣此方開胃之藥多於補脾以脾損由於胃虛故補胃而自益其脾也

此症用果腹飲亦效

白朮一兩　甘草一錢　破故紙一錢　砂仁一粒　茯苓三錢　芡實五錢　水煎服

人有終朝咳嗽吐痰微喘少若行動則短氣不足以息人以爲心火之刑肺誰知是肺氣之自損乎夫肺主氣五臟七腑雖各自有氣皆仰藉肺中清肅之氣以分布之也今肺金自損自衛不足何能分給於各臟腑乎且腎水非肺金之氣不生肺既自顧不暇不來生腎腎無肺

氣而水涸肺又分其氣以救子而不足自然子病而母之氣亦盡矣治法宜大補肺氣兼補腎水方用六味湯加麥冬五味子大劑與之久服腎旺而肺亦旺也夫六味湯補腎之藥即加五味麥冬之補肺而入於六味丸湯中仍是補腎者也補腎以治肺此勝於治肺者也腎旺而肺不必顧子況又有麥冬五味之滋肺受益正無盡也何損之不愈哉

此症用延息湯亦佳

人參百合各五錢甘草一錢熟地一兩山茱萸四錢牛膝二錢北五味五分茯苓三錢水煎服

人有貪用飲食甚至遇難化之物而不知止逢過寒之味而不知節遂至胸腹脹悶已而作痛生疼後至起噯吞酸見美味而作嗔不欲食者人皆以爲脾氣之困誰知是胃氣之損乎夫脾胃雖爲表裏然一主入而一主出能入而不能出者脾氣之衰能出而不能入者胃氣之乏也雖脾胃交相傷損然治法不可槩治必分別其何經之傷使損者多獲其益則胃易開而脾易健蓋脾胃同屬一土而補土實有兩法脾虛屬腎寒胃虛屬心冷也故補脾者必須補腎而補胃者必須補心不可混也

今見美味而嗔明是胃虛而非脾虛矣治法補其心火而胃氣自開方用六君子湯加味治之人參二錢白术三錢炒棗仁茯苓各三錢陳皮五分甘草五分半夏一錢乾姜炒二錢附子一片水煎服連用十劑胃中溫和再服十劑前症頓去此方雖仍是統治脾胃之藥然加棗仁乾姜附子之類是補心者居其重補脾者居其輕矣名是脾胃兼治實偏於治胃者也

此症用生氣湯亦妙

人參二錢白术一錢巴戟天二錢陳皮三分甘草二分茯苓二錢砂仁一粒穀芽一錢泡姜五分水煎服

癆瘵門

人有縱慾傷精兩脛痠痛腰背拘急行立足弱夜臥遺泄陰汗痿靡精神倦怠飲食減少而耳颼颼如聽風聲人以爲傳尸之癆瘵也誰知是自傷於腎爲初起之癆瘵乎夫人之貪色或立而行房或勞而縱送或一泄未已而再泄或已勞未息而再勞或興未來而强勉强合或力已竭而帶乏之圖歡或天分原薄服春藥而快志或材具本小學展龜以娛心或行役辛苦猶然交會或思慮困窮借以忘憂一宵之歡遂成終身之疾原不在婦女

之衆與泄精之多也不知節便即成癆矣必致失血兼之吐痰咳嗽夜熱盜汗畏寒畏熱似瘧非瘧胸中似饑非饑似痛非痛飲饌之類既不能多復不能化失情失緒骨蒸火動又思色以洩其火見色而動其意鬼交夢遺而不可止於是發寒發熱骨髓之中遂生癆蟲因循至死深可傷也治法補眞精之乏開胃氣之衰加之殺蟲之藥安在將死者之不可救乎方用救瘵湯熟地五錢白芍二錢山藥二錢沙參三錢地骨皮五錢麥冬二錢北五味十粒人參五分白微五分白芥子一錢鼈甲

一錢茯苓一錢水煎服十劑蟲死二十劑胃氣大開連服二月精神漸旺服一年而愈然必須斷色慾也此方補陰居多少加人參以助胃氣則補陰而無膩滯之憂即所用殺蟲之藥非狠虎毒味可比消弭於無形所以有益無損也此方看其平常配合精良以治初起之癆實有神功耳

此症用救敗湯治之

地骨皮丹皮各五錢人參三分白芍三錢山藥一兩甘草二分水煎服

一前病用前方妙矣然傷腎以成前病者世人頗多恐一

方不足以槪治也我更受異人之傳尚有一方以治前
病甚效因并誌之異人謂傷腎以致生癆蟲者必須先
殺其蟲後用補腎之藥則腎經受益否則徒補其精也
蓋蟲不去則所生之精僅足以供蟲之用蟲得精之旺
蟲之勢愈大與其於補中殺蟲不若先殺其蟲後補其
陰之爲勝惟是殺蟲之藥未有不更傷其陰者吾方則
不然雖死其蟲而於陰仍未有損且能開胃方名祛祟
丹鰻魚一條重六兩懷山藥三兩芡實一兩水煮極爛
少加青鹽同食食完不必吃飯一日必須食完連湯汁

飲之一次之後隔七日再照前食之三次則骨中之蟲無不死者然後另用起瘵湯人參一錢茯苓三錢麥冬三錢北五味子十粒生棗仁二錢熟地五錢山茱萸二錢巴戟天二錢白芍一錢白芥子五分沙參一錢水煎服服一月精漸旺矣再服一月全愈此方平中有奇前方奇中實平皆異人所傳余不敢隱願與世共之以救初起癆瘵之病云

人有夜臥常驚或多恐怖心懸懸未安氣吸吸欲盡淫夢時作盜汗日多飲食無味口內生瘡胸中煩熱終朝無

力惟思睡眠脣似硃塗顴如脂抹手足心熱液燥津乾人以爲腎經之癆瘵誰知腎傳於心而心初受病乎夫心宮寧靜邪不可侵邪侵於心則神必越出於外腎癆生蟲無形之邪氣犯心尚不可救烏容有形之蟲深入哉不知蟲雖有形而蟲之氣亦無形腎氣既交於心而腎中之蟲氣烏得不上交哉蟲之氣與腎之氣自是不同腎氣交心而心受益蟲氣交心而心受損何必蟲入心而心始病乎然則治法不必治心仍治腎可也然而徒治腎而蟲在則蟲之氣仍在腎心仍受蟲之害也故

救心必須滋腎而滋腎必須殺蟲方用起瘵至神湯熟
地一兩山茱萸五錢麥冬一兩茯苓五錢山藥五錢芡
實三錢肉桂三分白术三錢杜仲一錢鼈甲五錢百部
二錢水煎服連服十劑瘵蟲死矣再服一月腎氣旺而
心氣安再服一月全愈此方全是補腎安心之劑惟鼈
甲百部乃殺蟲之藥鼈甲深攻引百部直入於至陰之
內又是補陰而不傷於髓蟲以爲養身之味詎知是殺
身之味耶蟲死而腎無異氣則心氣受益而又有麥冬
茯苓白术之相扶自然慶安奠於宮中喜敉寧於殿上

也

此症用安養湯亦效

人參百部各一錢山藥一兩甘草三分麥冬五錢北五味十粒白术二錢茯神三錢水煎服

人有咳嗽吐痰氣逆作喘臥倒更甚鼻口乾燥不聞香臭時偶有聞即芬郁之味盡是朽腐之氣惡心欲吐肌膚枯燥時作疼痛肺管之內恍似蟲行乾皮細起狀如麩片人以為肺經痨瘵也誰知是心痨而傳之肺乎夫肺為嬌藏最惡心氣之尅心以正火刑肺肺尚受病況以尸蟲病氣移而刑肺肺安得而不病乎然而肺氣之傷

者傷於心之火氣也心受蟲氣之傷心自顧不遑何能分其蟲氣以尅肺不知心嫌蟲氣之侵乃不自受即以蟲氣移入於肺而自避其毒也況肺爲腎之母肺原能自交於腎而腎之蟲氣何獨不交於肺乎此心腎交侵癆瘵之勢倍重於腎之傳心矣治法消心中之蟲氣不若仍消腎中之蟲氣也然而心腎兩傷又消兩經之蟲藥必先經於胃蟲未必殺而胃氣先亡則肺金大失化源非治之善也法宜健胃則分布精液心腎有益胃又無損則蟲可得而誅矣方用健土殺蟲湯白朮五錢人

參二錢白微二錢萬年青一片熟地一兩麥冬一兩山茱萸三錢生棗仁三錢車前子二錢貝母一錢水煎服二劑氣喘少平又二劑咳嗽漸輕又二劑知香臭又二劑疼痛漸止服三月全愈此方補胃氣又不助陽消蟲氣又不損液腎足以制心而心不至於刑肺實治癆傳肺之妙法也

此症用獲肺飲亦佳

白术人參百合各二錢白微天冬各一錢麥冬三錢欵冬花五分天花粉桔梗各六分水煎服

人有兩目胱胱面無血色兩脇隱隱作痛熱則吞酸寒則

發嘔痰如鼻涕或清或黃臭氣難聞淚乾皆澀嘗欲合眼睡臥不安多驚善怖人以爲肝經之癆瘵也誰知是肺癆次傳於肝乎夫肺金尅肝木者也使肝木本旺肺何能尅之無如腎癆之後久不生肝則肝木無滋潤之氣肝弱可知肺即乘其弱將蟲氣交於肝肝欲拒之而無力不得已順受其蟲氣矣肝爲腎之子腎見肝子已受蟲氣惟恐肝氣不敵乃移其腎氣以生肝而蟲氣即因腎氣之移而同移入於肝矣蟲蝕肝血肝又何養乎治法仍須救腎以生肝兼之生肝以殺蟲也方用援瘵

湯白芍一兩當歸一兩熟地一兩山茱萸五錢茯苓五錢鼈甲五錢白微二錢水煎服十劑少痊二十劑更痊服三月乃愈此方肝腎兩治之湯也止鼈甲白微乃殺蟲之味不寒不熱既無偏勝之虞能補能攻又是兩全之道殺蟲於無形起死於將絕者也或謂瘵色青黃方中消瘵逐穢之品似不可少不知蟲入腎肝非直救二經何能奪命況消瘵逐穢之品用之益傷脾胃肝既受蟲之侵正欲移傳於脾倘再傷之不引蟲入於中州乎故寧大補腎肝使二臟受益其瘵自化斷不敢輕用消

痰逐穢之品以再傷脾胃耳

此症用療瘵湯亦佳

白芍熟地各五錢當歸四錢鼈甲三錢鏝魚骨燒黑灰三分北五味十粒水煎服

人有胸前飽悶食不消化吐痰不已時時溏瀉肚痛腹脹空則雷鳴脣口焦乾毛髮乾聳面色黃黑微微短氣怯難接續便如黑汁痰似綠涕人以爲脾經之癆瘵也誰知是肝癆而傳於脾乎夫五臟之癆傳入於脾本不可救不必更立救脾癆之法也雖然人有胃氣一綫未絕無不可接續於須臾脾與胃爲表裏胃絕則脾絕萬無

生理脾絕而胃未絕尚有生機正不可因其肝蟲之入
脾即諉於天命之絕也余自行醫以來曾救一婦人得
此症脈又細數衆醫皆以癆病傳脾爲必死之症其大
亦棄之不治余見飲食知味謂其夫曰尊正尚有一線
可救何忍看其死而不一援乎其夫曰衆醫皆棄而不
治非我不欲生之也余勸其單服二白散用山藥芡實
各等分約各四觔萬年青四大片各炒磨爲細末入白
糖一斤滚水調服遇饑即用無論數次其婦聞之如法
喜吞頭一日即服五大碗約五月每日如此脾氣漸服

漸愈竟得不死問其前後所服幾何約百斤也後見余稱謝因備誌之以助行醫方法之窮二味既能健脾尤能補腎腎脾兼治所以奏功况萬年青殺蟲於無形入之於二味之中蟲亦不知其何以消滅於無踪也此方不特單治脾癆但不可責其近功耳若加入人參二兩以助胃氣則胃氣更健脾氣尤易援耳

此症用援怯湯亦妙

白朮山藥各一兩茯苓三錢人參三錢芡實五錢白薇一錢鰻魚骨末五分肉桂三分水煎調服

人有陰虛火動每夜發熱如火至五更身凉時而有汗時

而無汗覺骨髓中內炎飲食漸少吐痰如白沫人以爲骨蒸之癆瘵也誰知是腎水不能制火乎夫腎中水火必須兩平火之有餘水之不足也水不足火始有餘骨蒸之病正坐於火旺水虧耳治法不必瀉腎中之火但補其腎中之水則水足濟火腎既不熱骨髓之內外何能熱乎方用凉髓丹地骨皮一兩丹皮一兩麥冬五錢金釵石斛三錢牛膝二錢茯苓二錢水煎服連服四劑而內熱輕再服四劑內熱盡除服一月而前症盡愈此方用地骨丹皮不特補腎中之水且取其能凉骨中之

髓與消骨外之血也夫骨中髓熱必耗其骨外之血骨外血熱必爍其骨中之髓故兼用二味則髓與血兩治無太熱之虞腎中寧獨熱哉況石斛牛膝無非補腎陰之味陰旺則陽平水勝則火退骨蒸不蒸而癆瘵何能成哉

此症用純陰湯亦佳

玄參麥冬丹皮地骨皮熟地各三錢水煎服

人有氣虛氣息短促不足以息與癆役形體氣急促者迥殊懶於語言飲食無味身體困倦人以為氣癆也誰知

是陽虛下陷由於內傷其元氣乎夫元氣藏於腎元之中上通肺而下通腎元氣不傷則腎中眞陽自升於肺而肺氣始旺行其清肅之令分布於五臟七腑之間若元氣一傷不特眞陽不能上升且下陷於至陰之中以生熱矣此熱乃虛熱非實熱也實熱可瀉虛熱宜補故必用甘溫之藥以退其虛熱然而單用甘溫以退其熱不用升提之味以挈其下陷之陽則陽沉於陰而氣不能舉雖補氣亦無益也即升提其氣矣不用補氣之味則升提力弱終難輕舉其氣也方用補中益氣湯人參

五錢白朮五錢炙黃芪三錢當歸三錢陳皮五分甘草五分升麻二分柴胡三分加貝母一錢水煎服一劑氣升二劑氣旺十劑生力胃氣大開前病頓失補中益氣湯乃李東垣一生學問全注於此方妙在用柴胡升麻於參朮芪歸之內一從左旋而升心肝腎之氣一從右旋而升肺脾胃命門之氣非僅升舉上中二焦之氣也

此症用提陷湯亦效

黃芪麥冬各五錢白朮人參各二錢甘草三分桔梗一錢神麯五分水煎服

人有血虛者面無色澤肌肉焦枯大腸乾燥心多怔忡健

忘不寐飲食少思羸瘠不堪夜熱無汗人以爲血痨也
誰知是肝燥而生火乎夫肝中火盛往往自焚終由於
腎水之不能生木非失血吐於外即耗血燥於內耳肝
旣自燥火生木中正可火生木外似乎心火得肝木之
火而旺矣無如木中有水則肝可生心木中有火則肝
能焚心故火在心中可取給於肝而火在肝中則自顧
之不暇耳然則治法必先治腎而治腎必先補水也方
用玄參一兩丹皮五錢沙參五錢白芍一兩當歸五錢
甘菊花三錢茯苓三錢麥冬五錢水煎服十劑夜熱除

二十劑燥症解三十劑各病均愈此方名爲滋肝飲實補腎以滋肝也肝得腎水之滋則肝木之火不發何致自焚而成癆哉

此症用加減四物湯

白芍當歸生地各五錢熟地一兩丹皮三錢水煎服

人有過於貪饕燔熬烹炙之物馨香甘肥之品盡情恣食以至食不能化胸中飽悶久則結成痞滿似塊非塊似瘕非瘕見食則憎每飯不飽面色黃瘦肢體日削人以爲因食成癆誰知是脾衰而不能化乎夫食未至而思

飧者胃氣之强也食已下而難受者脾氣之弱也過於貪饕正胃氣之强耳人恃胃氣不論精粗生冷盡皆食之未免損傷胃氣胃與脾爲表裏未有胃傷而脾不傷者然人有腎氣旺者雖胃傷而脾不能傷以腎中之火能生脾氣故脾氣不足往往補其腎火而愈今食不能消至於見食則憎是脾傷而胃亦傷單補腎中之火恐僅能生脾土而不能生胃土耳蓋脾土非腎火不生而胃火非心包之火不能長也治法必須補心包以生胃土補命門以生脾土也方用助火生土湯人參三錢白

术五錢黃芪五錢茯苓三錢甘草一錢肉桂一錢巴戟天五錢菖蒲五分山查十粒神麯五分遠志八分水煎服二劑脾氣健又二劑胃氣開十劑脾胃之氣大旺矣又十劑全愈此方上補心包下補命門中補脾胃火生而土健土健而食消不易之理也世人不知補火之道更不知補火而有心包命門之異所以口健脾而脾不健日開胃而胃不開必成癆而始止也豈不可歎息哉

此症用溫化湯亦佳

人參茯苓巴戟天鼈甲各三錢白术黃芪各一兩肉桂神麯各一錢枳殼五分白豆蔻一粒山查十粒水

煎服

人有遭遇坎坷或功名蹭蹬或柴米憂愁以致鬱結胸懷兩脇脹悶飲食日減顏色阻喪漸漸肢瘦形凋畏寒畏熱人以為因愁而成瘵也誰知是肝氣不宣木尅脾胃乎夫肝木最喜飛揚一遇寒風遇憂愁皆鬱而不伸也然而肝氣不肯自安於不伸於不伸之中而求其伸於是上不得展舒以生心下不得不刑尅而傷脾矣脾上既傷胃氣亦弱胃氣既弱而飲食自少何能分潤於臟腑哉人見其悠悠忽忽不飲不食疑是蟲之作祟乃用

消蟲逐穢之藥肝氣不開脾胃反損愈加困頓變成癆疾而死者比比也治法亦仍開其鬱結而已矣方用順適湯白芍一兩白朮三錢人參五分白芥子一錢當歸二錢鬱金一錢陳皮三分甘草五分茯苓三錢香附一錢川芎八分水煎服二劑脾胃開四劑寒熱除十劑鬱結之症盡散矣二十劑全愈此方專入肝經又能入脾入胃舒木氣之滯宣土氣之沉所以能奏功之神也若欲殺蟲祛祟此症本無蟲與祟也甚矣鬱癆之易治無如人之不知治鬱何哉

此症用適志湯亦效

白芍茯苓各五錢甘草枳壳半夏各五分砂仁一粒神麯香附人參各二錢蘇子一錢水煎服

世有尼僧寡婦失嫁之女丈夫久出不歸之妻妾相思鬱結欲男子而不可得內火暗動爍乾陰水肝血旣燥必致血枯經斷朝熱夜熱盜汗鬼交日復一日年復一年飲食懈怠肢體困倦肌膚甲錯面目暗黑人以爲瘀血之癆也誰知是乾血之瘵乎凡婦女慾火一動多不可解慾火者雷火也雷火一動而天地變陰陽乖水隨火而沸騰火得水而炎上有不燒乾者乎婦女之慾火乃

起於肝肝火者木中之火也雷火喜劈木者以火從木中出也夫肝火宜藏以肝藏血也肝火動則血不能藏矣火動則血泄况火不動則已動則不能遽止故火屢動而血屢泄動之不已則泄之不已血安得不乾乎治法似宜泄木中之火矣然而火止可暫瀉以止炎不可頻瀉以損木方用消愁湯白芍一兩當歸一兩葳蕤一兩玄參柴胡一錢五分丹皮三錢地骨五錢白芥子一錢熟地一兩水煎服連服數劑肝氣不燥再服數劑肝火可平更服十劑血枯者不枯諸症可漸愈也此方補

肝木而兼補腎水水旺而木得其養木平而火息其機不必治勞而勞自退補肝補腎之中而仍有開鬱達鬱之藥也彼徒補肝血徒瀉肝火者尚隔一層耳

此症用散思湯亦佳

生地一兩　白芍　丹皮各五錢　白朮一兩　地骨三錢　柴胡一錢　當歸五錢　陳皮五分　炒梔子二錢　荊芥一錢

水煎服

人有濕熱積於脾胃又加生冷之物存而不化久則變成寸白之蟲或結成蛔蟲之類以致腹痛肚疼面黃肌瘦盜汗淋漓氣怯身弱此是蟲積而不散也夫蟲生雖因

於濕熱之化而濕熱之積實因於脾胃之虛土堅之處蟲不能生土鬆則水入水入則濕留濕積則熱熱則蟲生矣然則治法不必用殺蟲之藥但健脾胃之土則蟲宜皆去然蟲居土之中既已成穴則子孫繁庶可知使單健其脾胃之土土氣薰蒸蟲未必不死吾恐不能盡死也故健其脾胃仍須佐以殺蟲之味則拔本塞源亦斬草除根之道也方用滅蟲湯白朮一兩檳榔二錢史君子二十箇人參三錢楝樹根三錢陳皮五分神麯三錢炙甘草二錢黃連三分百部一錢水煎服一劑蟲下

二劑蟲大下三劑蟲盡滅矣不必四劑也此方殺脾胃中濕熱之蟲非殺脾胃中血肉之蟲也血肉之蟲每有靈機濕熱之蟲原無知識小治尚可建功況以治痨蟲之法以治之乎毋怪元氣既回而殺蟲又捷也

此症用饅羹飲亦效

饅魚一觔煮湯四碗另用山藥白朮各二兩茯神神麯各三錢百部二錢肉桂一錢湯二碗煎一碗服渣再用湯二碗煎一碗服二劑全愈

人有好躭麯蘗致成酒積脾氣損傷五更作瀉久則淹淹忽忽飲食少思時多嘔吐盜汗淋漓人以為酒痨之病

誰知是脾腎兩虧乎夫酒從胃入似宜傷胃不知酒雖入於胃而受之者脾也脾所惡者濕而酒性正濕是脾之所惡也乃移而之腎腎雖水臟藏精而不藏濕酒氣薰蒸腎受酒氣之毒仍傳於脾而脾又不能受遂傳大腸而出大腸又惡酒氣之濕不肯久留而遄發矣飲酒既多下瀉必甚下多亡陰人安得不病乎人之貪酒而不啻肺腑之親日飲如故有加無已不至腐腸爛胃而不止然則治法必須先戒酒而後以化酒之藥以解酒毒仍以健脾益腎之品以救其火土之衰則酒癆之病

庶幾其可瘳乎方用消酒散白朮一兩山茱萸一兩葛花二錢薏仁一兩肉桂三分茯苓三錢水煎服十劑瀉輕又十劑瀉止又十劑而酒積除又十劑全愈此方脾腎兩補分解酒濕而消其毒也惟是酒性大熱今不特不解其熱并且用肉桂以助其熱者以濕之不行由於命門之火衰也眞火衰而邪火自盛眞火盛而邪火自衰則邪水自流矣

此症用解蘖湯亦可治之

白朮二兩茯苓五錢肉果二枚柞木枝五錢水煎服十劑愈

小兒多餐水果恣食肥甘以致成疳身體黃瘦毛豎膚焦形如猿猴狀如刺蝟食土食炭人以爲兒癆也誰知是脾胃虛寒之病乎小兒純陽本不宜虛寒也然而先天無虧而後天每不能無損蓋先天屬腎後天屬脾胃也小兒餐水果食肥甘正坐於傷脾胃耳脾胃一傷五臟之氣不能行六腑之氣不能運小兒性格不常何知樽節水果仍餐肥甘仍食欲不成癆何可得乎治法補其脾胃之氣調其飲食之傷原可隨手奏效寧至兒癆之病哉無如世醫以膽草蘆薈胡黃連之類以瀉其火以

半夏枳殼檳榔厚朴之類以降其痰以麥芽山查大黃之類以逐其食以梔子楝根烏梅以殺其蟲以至兒不勝任反消損其真元之氣無異下之石也方用六君子湯加減救之人參二錢白朮三錢茯苓三錢甘草三分附子一分黃芪三錢神麴五分水煎服一劑而兒之神氣轉再劑而兒之神氣生連服十劑無不全愈正不必多劑也此方原是補氣之劑補氣者補脾胃之氣也小兒之病原傷於脾胃也先天實未常傷脾胃之氣一轉是後天無損先天何不接續哉此癆病之所以易愈耳

此症用神人散亦甚效

人參二錢白朮三錢甘草五分肉桂三分白豆蔻一枚神麴五分半夏三分山查五枚水煎服

人有感染尸蟲遂至釀成癆病其症與所感之病人無異世爲傳尸癆者男子自腎傳心由心而肺由肺而肝由肝而脾女子自心傳肺由肺而肝由肝而脾由脾而腎五臟復傳六腑而死矣此古人之言也而孰知不然傳尸癆症感病人之蟲視蟲所入之臟卽於是臟見病無不傳於脾而死不必五臟之皆傳也彼五臟之皆傳者乃自傷於腎由腎而傳心心而肺肺而肝肝而於於脾

耳以自傳而為傳尸之病則誤之甚矣所以治傳尸之病不必同於治自傳之症也雖然傳尸之蟲雖不擇臟而入治法必須補胃腎為主而佐之殺蟲之味蓋胃氣不敗而津液能生腎氣不涸而火氣能伏且胃為腎之關門胃土能消而腎水始足傳尸之病未有腎水不竭者也此腎與胃之二經必宜兼補耳方用移尸滅怪湯

人參一兩山茱萸一兩當歸三錢乳香末一錢䖟蟲十四箇水蛭火煅死十四條二蠶沙末三錢各為末蜜為丸每日服百丸此藥服完而傳尸之蟲滅跡矣古人傳

祛逐癆蟲之藥多至損傷胃腎所以未能取效今用人
參以開胃用山茱萸以滋腎且山茱萸又是殺蟲之味
同䖟蟲水蛭以蟲攻蟲則易於取勝尤恐有形之物不
能深入於尸蟲之内加當歸以動之乳香以開之引其
直入而殺之也復慮蟲蝕補劑以散藥味更加二蠶沙
者乃蟲之糞也蟲遇蟲之糞則棄而不食而人參歸萸
得行其功力助諸藥以奏效也

此症用逐尸飲亦神

人參三分白朮二錢山茱萸五錢鰻魚骨燒灰一錢水煎服

人有傳染鬼疰者闔家上下大小無不生尸蟲之病是重於傳尸也蓋傳尸止病於一人一人死而一人又病非若鬼疰之重也此等之病雖是冤鬼相纏然初起之時未常非尸蟲引之也夫尸蟲作祟已能殺人況又有鬼邪相輔變動不一其爲害也更甚其症使人夢遺鬼交泄精淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡經年累月漸就困頓以至於死一家傳染多至滅門絕戸實可傷也葛雅川曾傳獺肝散以救人然止可救傳染之初起不可救傳染之已深余逢異人傳方名爲三清丸蒼朮

半斤炒人參三兩山茱萸一斤白微三兩䗪蟲三兩阿膠三兩白芍十兩鼈甲十兩鰻魚骨三兩白术一斤柏子仁不去油四兩地骨皮十兩沙參五兩肉桂一兩地栗粉一斤神麯三兩貝母二兩各爲細末蜜爲丸每日早晚各服三錢服一月而鬼氣散服二月而尸蟲死矣一家盡服之斷不致有絕門滅戶之禍也此方補陽氣以制陰則鬼不敢近滅尸氣以殺蟲則祟不敢藏有攻之益無攻之損起白骨而予以生全救闔家而令其壽考功實偉焉

此症用散瘧飲亦佳

鱉甲炒為末五錢　狐心末一錢　人參二錢　甘草三分　神麯二錢　白朮五錢　山茱萸五錢　白芍五錢　水煎服

服一月即愈不再傳

人有花前月下兩相盟誓或阻於勢而不能合或盡於緣而不能逢遂思結於心中魂馳於夢寐漸而茶飯懶吞語言無緒悠悠忽忽終日思眠面色憔悴精神阻喪因而畏寒畏熱骨中似疼非疼腹內如餒非餒人以為癆病之已成也誰知是相思之惡症乎夫相思之症原不必治遇情人而鬱開矣然而情人何易急得醫道豈竟

無他治哉大約相思之病先傷於心後傷於肝久則傷於脾胃欲治相思之症宜統心肝脾胃四經治之治此四經多有得生者未可信古人之言以相思之症為不可治之病也夫傷心之病本不可治如何相思之傷心猶為可救蓋思其人而不得必動肝火火動生心其實一綫之延正籍此肝木之火以生心也用平肝解鬱之品佐之補心安神之味益之開胃健脾之藥則肝氣一舒心火自發不必去生脾胃之土而相思病可逐漸而衰也倘更加人事之挽回何病之不可愈哉方用遂情

湯香附三分白芍一兩荊芥五分麥冬三錢茯神三錢白朮三錢生棗仁三錢人參五分神麯三分甘草一分柴胡五分白芥子五分水煎服十劑肝氣開又十劑心氣開又十劑脾胃之氣大開矣此方補多於散貴在調和不貴在爭戰也倘作癆瘵治之反無生機矣

此症用鬱蓮散亦甚佳

白芍一兩柴胡八分香附五分鬱金一錢生棗仁一錢茯神二錢巴戟二錢蓮子心三錢麥冬五錢丹參三錢水煎服

一、夢遺門

人有用心過度心動不寧以致夢遺者其症口渴舌乾面紅顴赤眼閉卽遺一夜有遺數次者疲倦困頓人以爲腎虛之過也誰知是心虛之故乎夫心喜寧靜不喜過勞過勞則心動心動則火起而上炎火上炎則水火相隔心之氣不能下交於腎腎之關門大開矣蓋腎之氣必得心氣相通而始能藏精而不洩今心不能攝腎則精焉得而不走乎雖然心未常不惡腎之不藏也無如心欲攝腎而力不能也然則治法何必治腎補心中之

虛而夢遺自止矣方用靜心湯人參三錢白朮五錢茯神五錢炒棗仁山藥各一兩芡實一兩甘草五分當歸三錢北五味十粒麥冬五錢水煎服二劑遺止十劑永不再遺也此方大補心氣之虛全不去瀉心之火蓋火之動由於心之過勞是火乃虛火非心之實火也實火可瀉虛火宜補世人以實火瀉之此夢遺之所以不能止也

此症用斷遺神丹亦效

人參一兩山藥五錢芡實五錢麥冬五錢北五味一錢水煎服

人有朝朝縱慾漁色不厭遂至夢遺不能止其症腰足痿弱骨內痠疼夜熱自汗終宵不乾人以為腎火之作祟也誰知是腎水涸竭乎夫腎中水火兩得其平久戰尚不肯泄夢中之遺實水火之不得平耳火衰而水旺者亦能遺火盛而水衰者亦能遺也二者相較火衰而遺者輕火盛而遺者重輕者略補火而即瘥重者非大補水而不能愈蓋火易接續而水難滋益也治法不必瀉火補腎水以制火可耳方用旺水湯熟地一兩沙參五錢北五味一錢山藥一兩芡實一兩茯苓五錢地骨皮

三錢水煎服連服四劑不遺矣此方純是補精絕不入濇精之藥以夢遺愈濇而愈遺也補其精則水足以制火之動火不動精能自止何必濇之今不特不濇且用通利之藥者以夢遺之人精竅大開由於尿竅之閉也火閉其尿竅則水走其精竅矣通其尿竅正所以閉其精竅也倘用濇藥精竅未必閉而尿竅反閉矣何日是止精之時哉

此症用熟地溹精丹亦佳

熟地二兩麥冬山藥芡實各一兩北五味一錢水煎服

人有怒氣傷肝忽然夢遺久而不止凡增煩惱泄精更多其症兩脇多悶火易上升於頭目飲食倦怠發躁發脹人以爲肝氣之動也誰知是肝血之燥乎夫肝中有火得血則藏何無血則不能藏也蓋肝中之火木中之火也木缺水則木乾肝少血則肝燥肝燥之極肝中之火不能自養乃越出於外往來心腎之間遊魂無定而作夢其夢每多淫夢者因肝氣之虛也治法補肝血而少瀉其火則火不旺而魂自歸何夢而再至於遺也方用潤木安魂湯當歸一兩白芍一兩甘菊花三錢北五味

五分茯苓五錢白朮五錢炒梔子一錢金櫻子三錢甘草五分水煎服二劑肝火平又二劑肝血旺又二劑夢遺止矣再用十劑永不再發此方寓瀉於補之中寓止於通之內反能歸魂而入於肝澀精而收於腎也倘不知補而徒瀉之不知通而單止之則肝無血養魂安能歸哉魂既不歸搖搖靡定夢難斷絕遺亦寧有止日耶

此症用芍藥潤燥丹亦可

白芍山藥各一兩炒梔子三錢芡實一兩水煎服

人有心氣素虛力難久戰然又思慕美色心中怦怦遂至

夢遺其症陽痿不振易舉易泄日日夢遺後且不必夢亦遺見美婦而心動聞淫語而色移聽女音而神馳往往走失不止面黃體瘦自汗夜熱人以為心腎之兩虛也誰知是心包之心大動乎夫心包為心君之相臣代君行令者也心氣旺則心包奉君令而不敢上奪其權心氣衰則心包奉君令而反行其政矣治法必須補心經之衰瀉心包之火則夢遺可斷而自遺亦可止也方用强心湯人參一兩茯神五錢當歸五錢麥冬三錢巴戟天五錢山藥五錢芡實五錢玄參五錢北五味五分

蓮子心三分水煎服連服四劑夢遺少矣再服四劑自遺少矣再服一月夢遺自遺均愈服三月不再發此方補心者居其七瀉心包者居其三蓋心包之旺原因於心氣之衰補其心則心旺而心包自衰故少加玄參蓮子以瀉心包之火而君相兩得其平矣但必須多服始能奏功積弱之勢成非一日其由來者久也漸移默奪之功烏可責旦夕哉

此症用蓮心清火湯亦效

玄參生地各五錢丹參三錢山藥芡實各一兩蓮子心二錢麥冬一兩北五味五分天冬一錢水煎服

人有素常縱慾又加勞心思慮終宵仍然交合以致夢遺不止其症口渴引水多飲又復不爽臥不安枕易驚易懼舌上生瘡脚心冰冷腰痠若空脚顫難立骨蒸潮熱神昏魂越人以為心腎之虛也誰知是心腎二經之火一齊俱動乎夫心中之火正火也正火必得腎水以相制腎中之火虛火也虛火必得心火以相伏故心火寧靜而腎火不能動也腎火之動由於心火之衰耳心腎兩動則二火相合豈能久存於中火性炎上自然上勝而不肯止矣一火動水猶不升兩火齊動安望其水之

下降乎火升之極即水降之極也心腎之氣不閉則玉關大開安得止之然則何以救之耶仍補其心腎氣足而關自閉也方用兩益止遺湯人參一兩熟地二兩山藥一兩芡實一兩白朮一兩生棗仁一兩黃連五分肉桂五分水煎服二劑遺即止服二月諸症全愈此方乃心腎交合之聖劑心腎交則二火自平正不必單止其遺也況止遺必用澀藥內火煽動愈澀而火愈起矣

此症亦可用

兩寧湯

熟地二兩麥冬二兩黃連一錢肉桂三分山藥一兩芡實一兩水煎服

人有專攻書史誦讀不輟至四鼓不寢遂成夢遺之症久
則玉莖著被精隨外泄不著則否飲食減少倦怠困頓
一人以爲心火之盛也誰知是腎火隨心火之奔越乎夫
一心火易動而難靜人一日之内無刻不動心也動心一
日至籍夜分之安寢則心之血歸於肝中而腎水來滋
雖腎水本來養肝而不養心然心氣旣歸於肝中腎即
養肝肝有不養心者乎自然以養肝者養心矣心旣得
養則心猶不動也惟過勞其心則心血耗損血不能歸
肝而火熾腎見心火之沸騰腎不來交矣況腎未必平

日之積畜則水源有虧水虧而火更旺火以引火心火乘熱而入腎客於下焦以鼓其精房於是精不閉藏而外泄矣此正氣虛絕欲脫之象也方用絕夢丹人參三錢麥冬五錢茯神三錢白朮三錢熟地一兩芡實五錢山藥五錢北五味一錢玄參一兩兔絲子三錢丹參三錢當歸三錢蓮子心三錢炒棗仁三錢陳皮三分沙參三錢水煎服十劑輕二十劑更輕三十劑痊如失此方安心之聖方即補腎之妙劑蓋合心腎而兩救之也人疑火盛之極宜用止火之味矣不知火起勞心火乃虛

火而非實火虛火可補不可瀉故大補心腎虛火自安

倘執君火爲實火妄用大寒過凉之藥則生機頓失矣

此症用養儒湯亦妙

熟地一兩金櫻子芡實山藥玄參麥冬各五錢牡蠣末三錢北五味五分水煎服

人有至夜脊心自覺如火之熱因而夢遺人以爲河車火燒也誰知是腎水之涸乎夫河車之路即脊骨之椎也腎之路走夾脊者乃腎水之路亦腎火之路也水火相濟而河車之路安水火相勝而河車之路塞路塞者無水以灌注之也無水相通則火氣上炎而成熱脊心安

得清凉哉火炎於上自然水流於下矣治法救在上之火炎必先沛在下之水涸水足火息黄河始可逆流也方用挽流湯熟地二兩山藥一兩白朮一兩澤瀉三錢玄參一兩北五味二錢山茱萸五錢水煎服十劑熱解二十劑遺絕此方純是補水之味過於酸收者取其收斂以止遺也夫夢遺之症愈澀愈遺玆何用酸收而不顧乎不知河車之路最喜酸澀非酸澀則水不逆流終日夢遺水成順流之勢水順流之至則火逆衝之至矣酸收之味用之於漫渥之中則逆流而上可以救中谷

之焚火降而水更升何至下遺之靡止乎故脊熱除而夢遺亦斷也

此症用充脊湯亦佳

山茱萸熟地山藥芡實各一兩北五味三錢金櫻子白术各三錢水煎服

[illegible]

陰陽脫門

一男子久戰不已忽然樂極情濃大泄不止精盡繼之以血氣喘而手足身體皆冷人皆以男脫精爲陽脫女脫精爲陰脫其實男女俱有陰陽之脫不必分男女以治之也大約脫症俱宜治陽蓋精脫之後精已盡亡是無陰也而陽氣亦在將脫未脫之際若不急救其陽氣則陽氣一散歸陰甚速況陰性遲而陽性速徒補其陰則迂緩之極何濟於事乎倘執補陰之說陰已盡泄內絕真陰之根又從何處補起是補陽可以續陰而補陰難

以引陽也然陰盡繼之以血似乎血亦宜止而止血之藥要不外澁藥以閉之但內已無陰何從閉塞不若用補氣之劑以助其陽氣陽旺而陰自能生陰陽交濟氣血交通自然精生血閉不溢之溢也方用續陰救絕湯

人參二兩白朮三兩附子一錢巴戟天一兩水煎服一劑血止二劑陰生連服四劑可以不死此方補陽氣之聖藥也用人參回絕續於無何有之鄉用白朮以通利其腰臍之氣用附子以追其散失之元陽用巴戟天補其心腎之陰仍是補陽之藥則陽回而陰亦回也倘不

用人參止用附朮巳𢧐亦可奪命於須臾然無參爲君主之味則附子之熱無以駕馭恐有陽旺陰消之弊倘能以補陰之藥濟其後亦不至有偏勝耳

此症用參附五味湯亦大效

人參三兩　附子二錢　北五味子三錢　水煎服

有婦人愛風月者盡情浪戰以致虛火沸騰陰精下脫死去更甦頭目昏暈止存遊氣人以爲陰脫也誰知是陽脫乎婦人主靜不主動最難泄精以婦人滿身純陰腎中獨存陽氣也男子成仙者採婦人之陽氣以爲丹母然而採者多而能得之者絕少凡婦人泄精必自動之

極而漏泄之時其樂有不可言者正泄其陽氣也陽氣之泄將一身骨髓之真陽盡從胞胎之管而噴出然亦止泄其氣而非泄其精也惟火動之極則肝氣大開血不藏矣血不藏則精亦不能固而腎中之真陰亦隨之俱洩當此之時婦人乃動極而不能自止情願身死以狥故愈動而愈泄而及至精盡一笑而亡惟藉男子緊抱其身以嘴哺氣陽不離陰之戶然後死去還魂是陽脫而陰尚未絕耳可不急救其陰乎然而救陰不能回陽必須仍救陽也方用回陽救陰丹人參三兩黃芪三

兩當歸一兩茯神五錢生棗仁三錢北五味子一錢水煎服一劑陽回二劑陰生然後方中再加熟地一兩山茱萸五錢一劑煎飲連服一月可以還元如故此方先用參以挽回於一時後用熟地山藥以善後於平日蓋人參實能救脫以回陽而不能救涸以填陰先補陽而後補陰則已脫之精可生未脫之氣易長庶不至陽旺而陰消也

此症用參朮湯亦可救

人參三兩白朮三兩水煎服

人有小便之時忽然寒噤脫去雖無陰精之泄然氣泄即

精泄也人以爲中風之症誰知是陰陽兩脫乎夫膀胱氣化殆能小便此氣卽腎中之氣也人過泄精則氣不能旺矣氣衰則精易泄精泄而氣益微小便之時脫去者未有不因過於交感泄精所致交感時泄精以脫者因於樂極情濃交感後當小便而脫者必戰敗陽痿之人故脫於男女身上者多有囘生脫於坑厠之地者每難救死蓋彼有陰陽之根此無陰陽之倚也然脫有不同倘脫去昏暈外勢縮入者尚可救援急以手拽出龜頭不使縮入後用生人湯救之方用生棗仁五錢人參

二兩附子三錢白朮四兩菖蒲五分水煎服一劑再甦二劑更健改用調陰回陽湯熟地二兩山茱萸一兩白朮一兩茯神三錢人參一兩肉桂一錢白芥子二錢水煎服調理二月而愈前方回陽于無何有之鄉後方生陰於正可續之際自然陽回而陰不至於驟絕陰生而陽不至於太旺耳或謂龜頭縮入明是寒極宜死之兆不知猶有生机者以内有陽氣未絶耳使陽已絶矣則龜頭反不深入龜頭之深入者陰欲入陽之兆也故以陽藥急救之而更甦矣

此症用參朮附子湯亦可效

人參白朮各二兩附子三錢水煎服

人有大便之時一時昏暈而脫者兩目上視手足冰冷牙關不收不能語言人亦以為中風不語也誰知是陰脫之症乎夫大便之能開闔者腎主之也腎水足大便無燥結之虞腎水衰大便有滑利之患是大便之燥潤全責之腎也然大腸之病何能遽絕不知大腸過燥則火爍其水而陰絕過滑則水制其火而陰亦絕也且大腸陰絕仍絕於腎耳故腎脫而大腸亦脫惟救其腎絕而已方用六味地黃湯熟地二兩山茱萸一兩茯苓八錢

丹皮六錢山藥一兩澤瀉六錢水煎服一劑昏暈甦再劑言語出連服一月全愈此方非救脫之藥也然腎水枯而腎始絕大滋其腎水枯槁之時得滂沱之澤則溝洫之間無非生意是補水正所以救腎之絕豈大腸得水而反不能救其脫乎

此症用兩援湯亦可治

熟地二兩當歸人參白朮各一兩肉桂二錢水煎服

人有並不與婦人交感一聞婦女之聲音而淫精流出雖非陰陽脫症之重然亦脫症之漸也夫陰陽不相離者也久戰不泄者腎火與腎水俱旺也惟腎水衰而火易

動腎火衰而水難固久戰不泄者非惟腎中水火之旺亦心中水火之旺也心火旺腎火不敢奪其權心水旺腎水不敢移其柄惟心中水少而腎中之水始有下竭之憂心中火少而腎中之火始有下移之患閨婦女之聲淫精即出此心中水火虛極而動也而腎中水火隨心君之動而外泄矣若流而不止此陰陽將脫之候尤爲危症苟不急治亦與鬼爲隣治法宜大補其心腎方用交濟湯人參五錢熟地一兩山茱萸五錢麥冬一兩栢子仁三錢龍骨醋焠二錢黃連五分肉桂五分當歸

五錢黃芪五錢水煎服十劑雖聞婦女之聲亦止而不流矣更服二十劑全愈此方心腎兩補少加澁精之味使玉門自閉不至經絡之大開也蓋心腎不交而玉門之關既易開心腎易交而玉門之關及難閉聞聲流精者其精原先離於腎宮故隨聞隨出亦其中之關門大開故耳所以宜用澁於補之中也

此症用葆精丸亦佳

人參五兩白朮黃芪各一斤山藥熟地芡實各一斤北五味三兩遠志四兩炒棗仁山萸肉巴戟天兎絲子麥冬各八兩龍骨三兩醋焠金櫻子四兩蜜爲丸每日早晚白滾水吞服各六錢一料全愈

淋證門

人有小便流白濁者如米泔之汁如屋漏之水或痛如刀割或澁似鍼刺溺溲短少大便後急此膀胱之火壅塞也此症大約得之入房不使暢泄而忍精者居多夫人精泄之時必由腰腎而上趨夾脊透泥丸而下喉嚨百節骨髓無不同趨下走於陰器而出倘少遏抑之則精即止遏於中途而不得散欲反原舊之百骸而不可得于是不得已而走膀胱之路欲隨溺而泄也夫膀胱化水而不化精且與腎爲表裡尤不肯將腎中之精外泄

故閉塞其口而精不得出膀胱因精在門外不敢化水而水不行水不行而火乃熾于是熬乾水液精色變而爲濁遂得下潤于膀胱而膀胱仍不受也乃自流於陰器而出矣治法瀉膀胱之火佐之以利水之味則火隨水流精亦隨火而散矣方用散精湯劉寄奴一兩車前子五錢黃栢五分白朮一兩水煎服一劑即愈此方用白朮以利腰臍之氣用車前以利水用黃栢以泄膀胱之火用寄奴以分清濁而此味性速無留滯之虞取其迅逐行水止血不至少停片刻也

此症用桂車湯亦效
車前子一兩肉桂三分知母一錢王不留行二錢水
煎服一
劑即通
人有小便流赤濁者似血非血似溺非溺溺管疼痛人以
為血淋也誰知是氣虛血壅乎夫氣旺則血行氣衰則
血閉然氣虛之人多不能忍精而戰不能忍而必欲忍
則精塞水竅氣衰不能推送以出由是積而內敗化為
膿血矣精化為血而血無所歸仍流於膀胱膀胱不能
化血隨其自流精化之血相火猶存火性作祟所以疼
痛也雖然精即化血精何能多血亦宜少何終日流而

不能止不知血與血同類也精既化血則血以引血何有底止乎治法急宜止血爲主然不可徒止血也止血必須補氣蓋氣能化血也方用斷血湯黃芪一兩當歸五錢三七根末三錢茯苓三錢丹皮三錢水煎服一劑血淋止二劑全愈此方用黃芪以補氣用當歸以補血氣既旺無難推送夫敗濁矣況所化精血久已外出所流者乃舊血而非敗血也今用補氣補血之藥以生新血新血一生舊血自止況有三七根之善於止血乎方中用丹皮以清血中之火茯苓以分其水中之血自然

清濁不至混襍壅阻得以疏通也世人不知治血淋之法以濕熱治之往往至於困頓耳

此症用玄車丹亦甚效

玄參車前子各一兩水煎服二劑即愈

人有小便之中溺沙石者其色不同而堅實如石投之熱湯之中頃刻不能即化其欲溺之時必疼痛欲死用盡氣力始得溺出而後快其症大約得之入房而又行路涉水或加沐浴而成之者人以爲砂石淋也誰知是腎火煎熬之故哉夫腎火之盛由於腎水之衰也入房泄精水虧之後其火未能遽息復加行役以勞其筋骨則

火且大動而不可止沐浴涉水似乎外水可以制火詎識腎火乃虛火也外水乘腎氣之虛直入以遏其火火乃不敢外散反閉守於腎宮腎水乃至陰之水猶天地之海水也海水得火而成鹽之塊腎水得火而成石之淋又何足怪乎惟是外水濇水也腎水鹹水也腎火喜鹹而畏濇一遇濇水之侵腎火閉結而不得伸乃行其氣於膀胱煎乾鹹水而成石也治法通其腎中之氣利其膀胱則腎火解而砂石自化矣方用化石湯熟地二兩茯苓一兩薏仁五錢山茱萸一兩澤瀉五錢麥冬五

錢玄參一兩水煎服一劑二劑輕十劑全愈此方不去治淋反去補腎以茯苓薏仁淡滲之藥解其鹹味以麥冬玄參微寒之品散其火氣以地黃山萸甘酸之珍滋其陰水又取其甘能化石而酸能消石也又慮其性滯而不行留而不走益之澤瀉之鹹鹹以入鹹且善走攻堅領羣藥趨於腎中又能出於腎外迅逐於膀胱之裏而破其塊也倘不補腎而惟治膀胱則氣不能出烏能化水哉

此症用化沙湯亦效

熟地二兩　山茱萸一兩　甘草二錢　澤瀉　車前子各三

錢水煎服

人有感濕氣而成淋者其症下身重溺管不痛所流者清水而非白濁人以為氣虛成淋誰知是濕重成淋乎五淋之中惟此淋最輕然而最難愈以濕不止在膀胱之經也夫濕從下受宜感於足今足不腫而變為淋是濕不入於皮膚而入於經絡且由經絡而入於臟腑矣然治臟腑之濕而經絡之濕宜乎盡散何淋症最難愈耶蓋濕之能入於臟腑者乘虛而入也瀉濕必損臟腑之氣氣損則不能行水濕何能瀉耶濕既難瀉淋何能即

愈哉故治濕必須利氣而利氣始能去淋也方用禹治湯白朮一兩茯苓一兩薏仁一兩車前子三錢水煎服此方利水而不耗氣分水而不生火勝於五苓散實多蓋五苓散有猪苓澤瀉未免過於疏決肉桂大熱未免過于薰蒸不若此方不熱不寒能補能利之爲妙也大約服此湯至十劑凡有濕症無不盡消不止淋病之速愈也

此症亦可用氣化湯治之

白朮一兩茯苓猪苓車前子各三錢黃芪一兩升麻五分水煎服

人有春夏之間或遭風雨之侵膚或遇暑氣之逼体上熱下濕交蒸欝悶遂至成淋絕無驚懼忍精之過人以爲濕熱之故也誰知是腎虛而感濕熱乎夫腎虛者腎中之火虛也腎寒則火不足以衛身外邪得以直入于腎幸腎中之水足以外護不至于深入乃客于腎之外郭腎與膀胱爲表裏腎之外卽膀胱也濕熱外邪遂入于膀胱之中代腎火之氣以行其氣化之令然膀胱得腎氣而能化得邪氣何能化哉故熱不化水濕且助火不爲溺而爲淋矣治法急宜逐膀胱之濕熱以清其化源

然而膀胱之濕熱去而腎氣仍弱何能通其氣于膀胱淋症即愈吾恐有變病之生矣故於利濕利熱之中更須益腎中之氣也方用通腎祛邪散白朮一兩茯苓五錢藋麥一錢薏仁五錢扁畜一錢肉桂三分車前子三錢水煎服此方分解濕熱又不損腎中之氣故腎氣反通轉能分解夫濕熱也淋症去而腎受益何至變生不測哉

此症用散淋湯亦效

白朮二兩　杜仲一兩　茯苓一兩　豨薟二錢　薏仁五錢

黃柏一錢　肉桂

一分水煎服

人有交感之時忽聞雷轟忽值人至不得泄精遂至變爲白濁溺管疼痛死如鍼刺人以爲腎精之内敗也誰知是胆氣之阻塞乎夫胆喜疏泄者也今胆氣受驚則收攝過多而十二經之氣皆不敢外泄精亦阻住而不得流遂畜積于膀胱陰器之間而胆氣不伸自顧未遑何能爲十二經决斷耶所以精變爲淋壅塞而艱于出也治法抒其胆氣少加導水之藥則胆氣旣伸得决其一往莫禦之氣自然水通而精亦化也方用助胆導水湯

竹茹三錢枳殻一錢車前子三錢白芍五錢蒼术三錢

滑石一錢木通二錢薏仁三錢豬苓二錢水煎服二劑少愈四劑全愈方中雖導水居多然導水之中仍是抒胆之味故胆氣開而淋症愈耳

此症用順胆湯亦效

柴胡黃芩各二錢白芍車前子各五錢茯神澤瀉炒梔子蒼朮各三錢

水煎服四劑愈

人有下痢之時因而小便閉塞溺管作痛變爲淋者人以爲濕熱太盛也誰知是清濁之不分乎夫夏感暑熱多飲凉水或過餐茶瓜皆能成痢是痢疾固濕熱所成惟是濕熱留于腸胃宜從大便而出今從小便而出者是

濕熱過盛其大勢雖趨于大腸而奔迫甚急大腸不及流乃走膀胱而膀胱得濕熱之氣則肺金清肅之令不行欲化溺而不得遂變爲白濁而滲出者也故清濁不分者專言膀胱非大小腸也然水入膀胱清濁之分全責其滲化之奇今因濕熱不能化非膀胱之病乎夫膀胱氣化能出氣者火也濕熱非火乎何得火而反變爲白濁耶不知膀胱寒而溺頻出膀胱熱而溺不能出白淋是熱而仍出者以其有濕以相雜耳且膀胱得火而化溺者乃眞火而非邪火也眞火化溺而易出邪火爍

溺而難出耳濕熱之火正邪火而非眞火也治法淸膀胱之邪火兼逐大腸之濕熱則痢止而淋亦止矣方用五苓散加減治之茯苓三錢猪苓二錢澤瀉五錢白朮五分炒梔子三錢白芍五錢檳榔二錢水煎服連服二劑少輕再服二劑又輕更服二劑全愈此方利水之藥多於治痢何以痢先愈而淋反後愈也蓋痢本濕熱所成利其水則濕熱易解水不走大腸而盡走於膀胱則膀胱反難滲水之速故少遲奏效耳

此症用分濁飲亦效

蘿蔔子一兩白茯苓澤瀉車前各五錢甘草黃栢各

一錢炒梔子
三錢水煎服